

EDUKACJA ZDROWOTNA

Informacja dla pacjentów po wykonanej gastroskopii

Po zakończeniu endoskopowego badania górnego odcinka przewodu pokarmowego (gastrokopii) ze względu na znieczulenie miejscowe tylnej ściany gardła 10% roztworem Lignocainy, Pacjent powinien powstrzymać się od przyjmowania płynów i pokarmów przez czas utrzymywania się znieczulenia gardła tj. ok. 1 godziny. W przeciwnym wypadku może dojść do zachłyśnięcia się Pacjenta.

Jeżeli w czasie gastrokopii były pobierane wycinki z błony śluzowej żołądka do badania histopatologicznego, albo wycinki w celu wykonania testu ureazowego w kierunku *Helicobacter Pylorii*, Pacjent powinien pamiętać, aby tego dnia przyjmował pokarmy i płyny do picia wyłącznie letnie.

Nie wolno pić ani jeść nic gorącego !!

Wyniki badań histopatologicznych odbiera Pacjent osobiście, albo osoba przez Pacjenta upoważniona pisemnie, w Pracowni endoskopowej po ok. 2-3 tygodniach od chwili wykonania badania.

Opracowanie:

Pielęgniarki Pracowni Endoskopowej.

BIURO WYKONAWCZE
ZESPÓŁU PIELĘGNIARSKIEGO
ODDZIAŁU CHOROBY WEWNĘTRZNYCH
Z PODODZIAŁEM REUMATOLOGII, GASTROENTEROLOGII
I SAMODZIELNYM PODODZIAŁEM KARDIOLOGII
SP ZOZ ZAW. LÓDŹ
mgr Ewa Ł...