

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ OBRAZOWYCH

Do wszystkich badań RTG mammografii i tomografii należy zdjąć z okolicy badanej plastikowe i metalowe elementy

BADANIA RTG

1. Przygotowanie do badania jamy brzusznej

W ciągu dwóch dni przed badaniem nie jeść: słodczy, owoców, warzyw, nie pić napojów gazowanych. Dzień przed badaniem około godz. 16:00 przyjąć środek przeczyszczający. Nie jeść już kolacji. W dniu badania stawić się na badanie na czczo.

2. Przygotowanie do badania kręgosłupa lędźwiowego

Dzień przed badaniem około godz. 16:00 przyjąć środek przeczyszczający. Nie jeść już kolacji. W dniu badania stawić się na badanie na czczo.

3. Przygotowanie do badania urografii

W ciągu dwóch dni przed badaniem nie jeść: słodczy, owoców, warzyw, nie pić napojów gazowanych. Dzień przed badaniem około godz. 16:00 przyjąć środek przeczyszczający. Nie jeść już kolacji. Dzień przed urografią (WIECZOREM) wypić około 1 litra wody niegazowanej. Rano w dzień urografii o godzinie 6:00 – wypić 500ml wody niegazowanej. W dniu badania stawić się na badanie na czczo (bez jedzenia) z opróżnionym pęcherzem.

Przy nadczynności tarczycy wymagana opinia endokrynologa o podaniu kontrastu.

Prosimy o dostarczenie aktualnych wyników badań krwi z kreatyniny (najlepiej wykonać na tydzień przed ustalonym badaniem- kreatynina ważna miesiąc).

W ramach środków ostrożności należy zaprzestać przyjmowania pochodnych BIGUANIDU (np. METFORMINA, FORMETIC, GLUFORMIN, METFORMAX, METFORMIN, SIOFOR) na 48 godzin przed badaniem z zastosowaniem środków kontrastowych i 48 godzin po badaniu.

Mammografia

Przygotowanie do badania mammograficznego:

1. W dniu badania podczas porannej higieny nie używać:
 - o balsamów ani innych kremów do ciała, zwłaszcza balsamów rozświetlających z dodatkiem opiłków metalowych
 - o dezodorantów z talkiem, kremowych oraz kulkowych
 - o talków ani zasypek do ciała
2. PRZYNIIEŚĆ ZDJĘCIA/PŁYTYĘ Z POPRZEDNIEJ MAMMOGRAFII

Tomografia komputerowa badania z kontrastem

1. Przygotowanie do Tomografii komputerowej z kontrastem

Na badanie proszę zgłosić się na czczo (6 godzin przed badaniem nie jeść i nie pić).

Przy nadczynności tarczycy wymagana opinia endokrynologa o podaniu kontrastu.

Prosimy o dostarczenie poprzednich badań obrazowych oraz aktualnych wyników badań krwi na kreatyninę (najlepiej wykonać na tydzień przed ustalonym badaniem TK - badania ważne miesiąc)

W ramach środków ostrożności należy zaprzestać przyjmowania pochodnych BIGUANIDU (np. METFORMINA, FORMETIC, GLUFORMIN, METFORMAX, METFORMIN, SIOFOR) na 48 godzin przed badaniem z zastosowaniem środków kontrastowych i 48 godzin po badaniu.

Proszę przynieść ze sobą 1 litr wody niegazowanej.

2. Przygotowanie do Tomografii komputerowej j.brzusznej/miednicy

Na badanie proszę zgłosić się na czczo (nie jeść 6 godzin przed badaniem).

Dzień wcześniej około godziny 16 przyjąć środki przeczyszczające i nie jeść kolacji a rano zgłosić się na czczo i po wypróżnieniu.

Dotyczy badań z kontrastem:

Przy nadczynności tarczycy wymagana opinia endokrynologa o podaniu kontrastu.

Prosimy o dostarczenie poprzednich badań obrazowych oraz aktualnych wyników badań krwi na kreatyninę (najlepiej wykonać na tydzień przed ustalonym badaniem TK - badania ważne miesiąc).

W ramach środków ostrożności należy zaprzestać przyjmowania pochodnych BIGUANIDU (np. METFORMINA, FORMETIC, GLUFORMIN, METFORMAX, METFORMIN, SIOFOR) na 48 godzin przed badaniem z zastosowaniem środków kontrastowych i 48godzin po badaniu.

Proszę przynieść ze sobą 1 litr wody niegazowanej.

3. Przygotowanie do badania TK serca i naczyń wieńcowych:

- należy jak zwykle przyjąć wszystkie stosowane codziennie lek
- w dniu badania zgłosić się na czczo (nie jeść 6 godzin przed badaniem)
- w dniu badania nie należy przyjmować pokarmów/napojów przyspieszających czynność serca-nie należy pić kawy ani napojów energetycznych
- po badaniu wskazane jest nawadnianie organizmu (picie wody niegazowanej)
- należy dostarczyć dokumentację medyczną
- listę leków
- przy nadczynności tarczycy wymagana opinia endokrynologa o podaniu kontrastu.

Prosimy o dostarczenie poprzednich badań obrazowych oraz aktualnych wyników badań krwi na kreatyninę (najlepiej wykonać na tydzień przed ustalonym badaniem TK – badania ważne miesiąc.

W ramach środków ostrożności należy zaprzestać przyjmowania pochodnych BIGUANIDU (np. METFORMINA, FORMETIC, GLUFORMIN, METFORMAX, METFORMIN, SIOFOR) na 48 godzin przed badaniem z zastosowaniem środków kontrastowych i 48 godzin po badaniu.

BADANIA USG

RODZAJ BADANIA	SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Jama brzuszna (w tym nerki)	Na badanie zgłosić się na czczo 6 godzin przed badaniem nie spożywać posiłków i słodkich, można pić wodę niegazowaną lub gorzką herbatę
Jama brzuszna + gruczoł krokowy przepęcherzowo (w tym zaleganie moczu po mikcji)	Na czczo lub co najmniej 6 godz. bez jedzenia, można pić wodę niegazowaną lub gorzką herbatę, ok. godzinę przed badaniem oddać mocz i wypić w krótkim czasie ¾ l płynu
Jama brzuszna + pęcherz moczowy (w tym zaleganie moczu po mikcji)	Okolo 1.5 godziny przed planowanym badaniem usg należy wypić ok 1 litra niegazowanej wody w celu wypełnienia pęcherza moczowego (nie oddawać moczu przed badaniem !!!) badanie wykonywane jest przy zgłoszonym przez pacjenta uczuciu parcia na pęcherz moczowy
Nerki + stercz przepęcherzowo = (układ moczowy + stercz przepęcherzowo) (w tym zaleganie moczu po mikcji)	Ok. godzinę przed badaniem oddać mocz i wypić w krótkim czasie ¾ l płynu
Układ moczowy (nerki + pęcherz, w tym zaleganie moczu po mikcji)	Ok. godzinę przed badaniem oddać mocz i wypić w krótkim czasie ¾ l płynu
Prostata (= gruczoł krokowy = stercz) przepęcherzowo (w tym zaleganie moczu po mikcji) (miednica mała)	Ok. godzinę przed badaniem oddać mocz i wypić w krótkim czasie ¾ l płynu
Pęcherz moczowy (+ zaleganie moczu po mikcji)	Ok. godzinę przed badaniem oddać mocz i wypić w krótkim czasie ¾ l płynu
Zaleganie moczu po mikcji	Ok. godzinę przed badaniem oddać mocz i wypić w krótkim czasie ¾ l płynu
Gruczoł krokowy rektalnie, narząd rodny rektalnie (TRUS)	Po lewatywie, przed badaniem oddać mocz
Narząd rodny (miednica mała u kobiet) przepęcherzowo	ok. godzinę przed badaniem oddać mocz i wypić w krótkim czasie ¾ l płynu
tarczycyca	Bez przygotowania
Sutki (piersi)	Bez przygotowania
jądra	Bez przygotowania
narząd rodny vaginalnie	Przed badaniem oddać mocz
Drogi nasienne (jądra + gruczoł krokowy rektalnie)	Po lewatywie, przed badaniem oddać mocz
Ciąża	Bez przygotowania
Ślinianki	Bez przygotowania
Przekroczone	Bez przygotowania
Tkanki miękkie	Bez przygotowania
Penis	Bez przygotowania
Moszna	Bez przygotowania
Pachwina	Bez przygotowania
Szyja	Bez przygotowania