

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ OBRAZOWYCH

Do wszystkich badań RTG mammografii i tomografii należy zdjąć z okolicy badanej plastikowe i metalowe elementy

BADANIA RTG

1. Jama brzuszna

W ciągu dwóch dni przed badaniem nie jeść: słodczy, owoców, warzyw, nie pić napojów gazowanych. Dzień przed badaniem około godz. 16:00 przyjąć środek przeczyszczający. Nie jeść już kolacji. W dniu badania stawić się na badanie na czczo.

2. Urografia

W ciągu dwóch dni przed badaniem nie jeść: słodczy, owoców, warzyw, nie pić napojów gazowanych. Dzień przed badaniem około godz. 16:00 przyjąć środek przeczyszczający.

Dzień przed badaniem (wieczorem) wypić około 1 litra wody niegazowanej.

Nie jeść już kolacji.

Rano w dzień urografii o godzinie 6:00 – wypić 500ml wody niegazowanej.

W dniu badania stawić się na badanie na czczo (bez jedzenia) z opróżnionym pęcherzem

- należy dostarczyć aktualne wyniki badań krwi – poziomu kreatyniny (ważne 3 miesiące).

- przy nadczynności tarczycy wymagana opinia endokrynologa o podaniu kontrastu.

- po badaniu wskazane jest nawadnianie organizmu (picie wody niegazowanej)

MAMMOGRAFIA

W dniu badania podczas porannej higieny nie używać:

- balsamów ani innych kremów do ciała, zwłaszcza balsamów rozświetlających z dodatkiem opiółków metalowych
- dezodorantów z talkiem, kremowych oraz kulkowych
- talków ani zasypek do ciała

Przynieść zdjęcia/płytę z poprzedniej mammografii

MAMMOGRAFIA SPECTRALNA (Z KONTRASTEM)

- 2 godziny przed badaniem nie jeść

- należy dostarczyć

- poprzednie badania obrazowe – płyta z badaniem oraz skierowanie z programu

- aktualne wyniki badań krwi – poziomu kreatyniny (ważne 3 miesiące).

- przy nadczynności tarczycy wymagana opinia endokrynologa o podaniu kontrastu

- po badaniu wskazane jest nawadnianie organizmu (picie wody niegazowanej)

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA BADANIA Z KONTRASTEM

- przyjąć wszystkie stosowane leki przed badaniem (po lekkim śniadaniu), popijając niegazowaną wodą.

- 2 godziny przed badaniem nie jeść.

- należy w dniu badania dostarczyć

- poprzednie badania obrazowe – płyta z badaniem

- aktualne wyniki badań krwi – poziomu kreatyniny (ważne 3 miesiące).

Proszę przynieść 1 litr wody niegazowanej.

- przy nadczynności tarczycy wymagana opinia endokrynologa o podaniu kontrastu

- po badaniu wskazane jest nawadnianie organizmu (picie wody niegazowanej)

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA SERCA I NACZYŃ WIEŃCOWYCH:

- przyjąć wszystkie stosowane leki przed badaniem (po lekkim śniadaniu), popijając niegazowaną wodą.

- 2 godziny przed badaniem nie jeść

- należy w dniu badania dostarczyć

- dokumentację medyczną (z uwzględnieniem operacji i zabiegów kardiologicznych m.in. stenty) oraz listę leków, które pacjent przyjmuje

- aktualne wyniki badań krwi – poziomu kreatyniny (ważne 3 miesiące).

- pacjent powinien się stawić na badanie z tętnem ustabilizowanym na poziomie nie przekraczającym 65/min

- w dniu badania nie należy pić kawy, mocnej herbaty, ani napojów energetycznych

- przy nadczynności tarczycy wymagana opinia endokrynologa o podaniu kontrastu.

- po badaniu wskazane jest nawadnianie organizmu (picie wody niegazowanej)

BADANIA USG

RODZAJ BADANIA	SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Jama brzuszna (w tym nerki)	Na badanie zgłosić się na czczo 6 godzin przed badaniem nie spożywać posiłków i słodkich, można pić wodę niegazowaną lub gorzką herbatę
Jama brzuszna + gruczoł krokowy przepęcherzowo (w tym zaleganie moczu po mikcji)	Na czczo lub co najmniej 6 godz. bez jedzenia, można pić wodę niegazowaną lub gorzką herbatę, ok. godzinę przed badaniem oddać mocz i wypić w krótkim czasie $\frac{3}{4}$ l płynu
Jama brzuszna + pęcherz moczowy (w tym zaleganie moczu po mikcji)	Okolo 1.5 godziny przed planowanym badaniem usg należy wypić ok 1 litra niegazowanej wody w celu wypełnienia pęcherza moczowego (nie oddawać moczu przed badaniem !!!) badanie wykonywane jest przy zgłoszonym przez pacjenta uczuciu parcia na pęcherz moczowy
Nerki + stercz przepęcherzowo = (układ moczowy + stercz przepęcherzowo) (w tym zaleganie moczu po mikcji)	Ok. godzinę przed badaniem oddać mocz i wypić w krótkim czasie $\frac{3}{4}$ l płynu
Układ moczowy (nerki + pęcherz, w tym zaleganie moczu po mikcji)	Ok. godzinę przed badaniem oddać mocz i wypić w krótkim czasie $\frac{3}{4}$ l płynu
Prostata (= gruczoł krokowy = stercz) przepęcherzowo (w tym zaleganie moczu po mikcji) (miednica mała)	Ok. godzinę przed badaniem oddać mocz i wypić w krótkim czasie $\frac{3}{4}$ l płynu
Pęcherz moczowy (+ zaleganie moczu po mikcji)	Ok. godzinę przed badaniem oddać mocz i wypić w krótkim czasie $\frac{3}{4}$ l płynu
Zaleganie moczu po mikcji	Ok. godzinę przed badaniem oddać mocz i wypić w krótkim czasie $\frac{3}{4}$ l płynu
Gruczoł krokowy rektalnie, narząd rodny rektalnie (TRUS)	Po lewatywie, przed badaniem oddać mocz
Narząd rodny (miednica mała u kobiet) przepęcherzowo	ok. godzinę przed badaniem oddać mocz i wypić w krótkim czasie $\frac{3}{4}$ l płynu
tarczyca	Bez przygotowania
Sutki (piersi)	Bez przygotowania
jądra	Bez przygotowania
narząd rodny vaginalnie	Przed badaniem oddać mocz
Drogi nasienne (jądra + gruczoł krokowy rektalnie)	Po lewatywie, przed badaniem oddać mocz
Ciąża	Bez przygotowania
Ślinianki	Bez przygotowania
Przekroczone	Bez przygotowania
Tkanki miękkie	Bez przygotowania
Penis	Bez przygotowania
Moszna	Bez przygotowania
Pachwina	Bez przygotowania
Szyja	Bez przygotowania

SP ZOZ MSWiA w ŁODZI
ZAKŁAD RADIOLOGII
91-425 Łódź, ul. Północna 42
REGON: 470805076, NIP: 726-00-04-820
tel. 42 63 41 183

KIEROWNIK
ZAKŁADU RADIOLOGII
SP ZOZ MSWiA w ŁODZI

dr n. med. Piotr Kordek